

貯 法：防湿、室温保存
使用期限：外箱に表示
規制区分：劇薬、処方箋医薬品（注意-医師等の
処方箋により使用すること）

承認番号	23000AMX00517000
薬価収載	2018年12月
販売開始	2018年12月

徐放性鎮痛・抗炎症剤

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」

DICLOFENAC SODIUM SR CAPSULES 37.5mg「ZE」

ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- 消化性潰瘍のある患者[消化性潰瘍を悪化させる（ただし、「1. 慎重投与」の項参照）。]
- 重篤な血液の異常のある患者[副作用として血液障害が報告されているため血液の異常を悪化させるおそれがある（「4. 副作用」の項参照）。]
- 重篤な肝障害のある患者[副作用として肝障害が報告されているため肝障害を悪化させることがある（「4. 副作用」の項参照）。]
- 重篤な腎障害のある患者[腎血流量低下作用があるため腎障害を悪化させることがある。]
- 重篤な高血圧症のある患者[プロスタグランジン合成阻害作用に基づくNa・水分貯留傾向があるため血圧をさらに上昇させるおそれがある。]
- 重篤な心機能不全のある患者[プロスタグランジン合成阻害作用に基づくNa・水分貯留傾向があるため心機能を悪化させるおそれがある。]
- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等により誘発される喘息発作）又はその既往歴のある患者[重症喘息発作を誘発する。]
- 妊娠又は妊娠している可能性のある婦人（「6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）
- トリアムテレンを投与中の患者（「3. 相互作用」の項参照）

【組成・性状】

本剤は白色の速溶性顆粒及び徐放性顆粒からなる複合粒を含有する硬カプセル剤である。

成分・分量 (1カプセル中)	色調	号数	外形・サイズ (mm)	重量 (mg)
			識別コード	
ジクロフェナクナトリウム 37.5mg	白色	4号		190

添加物として、白糖、トウモロコシデンプン、ポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、その他2成分を含有する。また、カプセル本体にゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

【効能・効果】

下記の疾患並びに症状の鎮痛・消炎

関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群

【用法・用量】

通常、成人にはジクロフェナクナトリウムとして1回37.5mgを1日2回食後に経口投与する。

【使用上の注意】

- 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - 消化性潰瘍の既往歴のある患者[消化性潰瘍を再発させることがある。]
 - 血液の異常又はその既往歴のある患者[血液の異常を悪化又は再発させるおそれがある。]

- 出血傾向のある患者[血小板機能異常がおこることがあるため出血傾向を助長するおそれがある。]
- 肝障害又はその既往歴のある患者[肝障害を悪化又は再発させることがある。]
- 腎障害又はその既往歴のある患者[腎血流量低下作用があるため腎障害を悪化又は誘発することがある。]
- 腎血流量が低下しやすい患者[心機能障害のある患者、利尿剤や腎機能に著しい影響を与える薬剤を投与中の患者、腹水を伴う肝硬変のある患者、大手術後、高齢者等では有効循環血液量が低下傾向にあり、腎血流量が低下しやすいので、腎不全を誘発するおそれがある。]
- 高血圧症のある患者[プロスタグランジン合成阻害作用に基づくNa・水分貯留傾向があるため血圧をさらに上昇させるおそれがある。]
- 心機能障害のある患者[プロスタグランジン合成阻害作用に基づくNa・水分貯留傾向があるため心機能を悪化させるおそれがある。]
- SLE（全身性エリテマトーデス）の患者[SLE症状（腎障害等）を悪化させるおそれがある。]
- 過敏症の既往歴のある患者
- 気管支喘息のある患者[気管支喘息患者の中にはアスピリン喘息患者も含まれており、それらの患者では重症喘息発作を誘発する。]
- 潰瘍性大腸炎の患者[症状が悪化したとの報告がある。]
- クローン病の患者[症状が悪化したとの報告がある。]

※※ (14) 消化管手術後の患者[消化管縫合不全を起こすおそれがある。]

- 食道通過障害のある患者[食道に停留し食道潰瘍をおこすおそれがある（「9. 適用上の注意」の項参照）。]
- 高齢者[副作用、特に過度の体温下降・血圧低下によるシヨック症状があらわれやすい（「2. 重要な基本的注意」、「5. 高齢者への投与」の項参照）。]
- 非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行われている患者（ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効果又は効果としているが、ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もあるので、本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること。）

2. 重要な基本的注意

- 消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに留意すること。
- 患者の状態を十分に観察し、副作用の発現に留意すること。過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等があらわれることがあるので、特に高熱を伴う高齢者又は消耗性疾患の患者においては、投与後の患者の状態に十分注意すること。
- 重篤な肝障害があらわれることがあるので、患者の状態を十分に観察すること。特に連用する場合は定期的に肝機能検査を行うことが望ましい。また、肝障害に先行して、あるいは同時に急激な意識障害があらわれることがある。
- 慢性疾患（関節リウマチ、変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
 - 長期投与する場合には、定期的に臨床検査（尿検査、血液検査及び肝機能検査等）を行うこと。また、異常が認められた場合には、減量、休薬等の適切な措置を講ずること。
 - 薬物療法以外の療法も考慮すること。

- ※ (5) 感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染症を合併している患者に対して用いる場合には必要に応じて適切な抗菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に投与すること。
 (6) 他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。
 (7) 本剤投与中に眠気、めまい、霧視を訴える患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように十分注意すること。

3. 相互作用

本剤は主に代謝酵素CYP2C9で代謝される。

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トリアムテレン (トリテレン)	急性腎障害があらわれたとの報告がある。	本剤の腎プロスタグラジン合成阻害作用により、トリアムテレンの腎障害を増大すると考えられる。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP2C9を阻害する薬剤 ボリコナゾール等	本剤のCmaxとAUCが増加することがある。	これらの薬剤は本剤の代謝酵素であるCYP2C9を阻害する。
ニューキノロン系抗菌剤 エノキサシン等	痙攣をおこすおそれがある。痙攣が発現した場合には、気道を確保し、ジアゼパムの静注等を行う。	ニューキノロン系抗菌剤が脳内の抑制性神経伝達物質であるGABAの受容体結合を濃度依存的に阻害し、ある種の非ステロイド性抗炎症剤との共存下ではその阻害作用が増強されることが動物で報告されている。
リチウム 強心配糖体 ジゴキシン等 メトトレキサート	これらの薬剤の血中濃度を高め、その作用を増強することがある。必要に応じて、これらの薬剤の用量を調節する。	本剤の腎プロスタグラジン合成阻害作用により、これらの薬剤の腎クリアランスが低下するためと考えられる。
アスピリン	相互に作用が减弱されることがある。	アスピリンは本剤の血漿蛋白結合を減少させ、血漿クリアランスを増加させることにより、その血中濃度を減少させる。逆に、本剤により、アスピリンの尿中排泄量が増加するとの報告がある。
	消化器系の副作用を増強させるおそれがある。	両剤とも消化管の障害作用をもつため、併用した場合その影響が大きくなるおそれがある。
非ステロイド性消炎鎮痛剤	相互に胃腸障害等が増強されることがある。	両剤とも消化管の障害作用をもつため、併用した場合その影響が大きくなるおそれがある。
副腎皮質ステロイド剤 プレドニゾロン等	相互に副作用、特に、胃腸障害等が増強されることがある。	両剤とも消化管の障害作用をもつため、併用した場合その影響が大きくなる。
降圧剤 β -遮断剤 ACE阻害剤 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤等	これらの薬剤の降圧作用を減弱することがあるので、用量に注意すること。	本剤の腎プロスタグラジン合成阻害作用により、これらの薬剤の血圧低下作用を減弱するおそれがある。
	腎機能を悪化させるおそれがある。	プロスタグランジン合成阻害作用により、腎血流量が低下するためと考えられる。 危険因子：高齢者

利尿剤 ヒドロクロロチアジド、フロセミド等	これらの薬剤の作用を減弱させることがある。利尿効果、血圧を観察し、必要に応じてこれらの薬剤の增量を考慮する。	本剤の腎プロスタグラジン合成阻害作用により、これらの薬剤の利尿効果を減弱するおそれがある。
カリウム保持利尿剤 スピロノラクトン、カシレノ酸抗アルドステロン剤 エプレレノン	これらの薬剤の作用を減弱せることがある。また、腎機能障害患者における重度の高カリウム血症が発現するおそれがある。	プロスタグランジン産生が抑制されることによって、ナトリウム貯留作用による降圧作用の減弱、カリウム貯留作用による血清カリウム値の上昇がおこると考えられる。 危険因子：腎機能障害
※※ 抗凝血剤及び抗血小板薬 ワルファリン、レビパリン、クロビドグレル、エノキサバリン等 デフィブロチド	出血の危険性が増大するとの報告がある。血液凝固能検査等出血管理を十分に行う。	本剤の血小板機能阻害作用とこれらの薬剤の作用により、出血の危険性が増大する。
シクロスボリン	シクロスボリンによる腎障害を増強するとの報告がある。腎機能を定期的にモニターしながら慎重に投与する。	機序は十分解明されていないが、本剤はシクロスボリンによる腎障害に対して保護的な作用を有するプロスタグラジンの合成を阻害し、腎障害を増大すると考えられる。
ドロスピレノン・エチニルエストラジオール	高カリウム血症があらわれるおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。	高カリウム血症の副作用が相互に増強されると考えられる。
コレステラミン	本剤の血中濃度が低下するおそれがある。コレステラミンによる吸収阻害を避けるため、コレステラミン投与前4時間若しくは投与後4~6時間以上、又は可能な限り間隔をあけて慎重に投与すること。	コレステラミンは陰イオン交換樹脂であり、消化管内で胆汁酸、陰イオン性物質や酸性物質等と結合してその吸収を遅延・抑制させる。
選択的セトニン再取り込み阻害剤(SSRI) フルボキサン、パロキセチン	消化管出血があらわれることがあるので、注意して投与すること。	これらの薬剤の投与により血小板凝集が阻害され、併用により出血傾向が増強すると考えられる。

4. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1) 重大な副作用(頻度不明)

以下のような副作用があらわれることがある。

このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

- 1) ショック(胸内苦悶、冷汗、呼吸困難、四肢冷却、血圧低下、意識障害等)、アナフィラキシー(荨麻疹、血管浮腫、呼吸困難等)
- 2) 出血性ショック又は穿孔を伴う消化管潰瘍
- 3) 消化管の狭窄・閉塞(消化管の潰瘍に伴い、狭窄・閉塞があらわれることがある)

- 4) 再生不良性貧血、溶血性貧血、無顆粒球症、血小板減少
 - 5) 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群)、紅皮症(剝脱性皮膚炎)
 - 6) 急性腎障害(間質性腎炎、腎乳頭壊死等)(症状・検査所見:乏尿、血尿、尿蛋白、BUN・血中クレアチニン上昇、高カリウム血症、低アルブミン血症等)、ネフローゼ症候群
 - 7) 重症喘息発作(アスピリン喘息)
 - 8) 間質性肺炎
 - 9) うつ血性心不全、心筋梗塞
 - 10) 無菌性髄膜炎(頸部硬直、発熱、頭痛、恶心・嘔吐あるいは意識混濁等)[特にSLE又はMCTD等のある患者では注意すること。]
 - 11) 重篤な肝障害(劇症肝炎、広範な肝壊死等)
 - 12) 急性脳症(特に、かぜ様症状に引き続き、激しい嘔吐、意識障害、痙攣等の異常が認められた場合には、ライ症候群の可能性を考慮すること)
 - 13) 横紋筋融解症(急激な腎機能悪化を伴うことがある)(症状:筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇等)
 - 14) 脳血管障害
- (2) その他の副作用

種類	頻度	頻度不明
消化器		食欲不振、恶心・嘔吐、下痢、口内炎、胃部不快感、胃痛、腹痛、消化性潰瘍、胃腸出血、便秘、口角炎、軟便、口渴、胃炎、小腸・大腸の潰瘍、出血性大腸炎、クローン病又は潰瘍性大腸炎の悪化、膀胱炎、食道障害、吐血、下血
血液		貧血、白血球減少、好酸球增多、出血傾向、血小板機能低下(出血時間の延長)
肝臓		肝障害、AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇、黄疸
腎臓		クレアチニン上昇、BUN上昇
皮膚		瘙痒症、光線過敏症、多形紅斑、紫斑
過敏症		発疹、顔面浮腫、潮紅、蕁麻疹、喘息発作、アレルギー性紫斑、血管浮腫
精神神経系		不眠、眠気、頭痛、めまい、神経過敏、しびれ、振戦、錯乱、幻覚、痙攣、抑うつ、不安、記憶障害
感覚器		視覚異常(霧視等)、耳鳴、味覚障害、聴覚障害
循環器		血圧上昇、血圧低下、動悸、頻脈
その他		浮腫、発熱、夜間頻尿、全身倦怠感、発汗、脱毛、胸痛、血管炎

5. 高齢者への投与

高齢者では、副作用があらわれやすいので、少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること(「2.重要な基本的注意」の項参照)。

6. 妊婦・産婦・授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。[妊娠中の投与で、胎児に動脈管収縮・閉鎖、徐脈、羊水過少がおきたとの報告があり、胎児の死亡例も報告されている。また、分娩に近い時期での投与で、胎児循環持続症(PFC)、動脈管開存、新生児肺高血圧、乏尿がおきたとの報告があり、新生児の死亡例も報告されている。]
- (2) 子宮収縮を抑制することがある。
- (3) 本剤投与中は授乳を避けさせること。[母乳中へ移行することが報告されている。]

7. 小児等への投与

ジクロフェナクナトリウム製剤を解熱目的で投与後にライ症候群を発症したとの報告があり、また、同効類薬(サリチル酸系医薬品)とライ症候群との関連性を示す海外の疫学調査報告がある。

[ライ症候群:水痘、インフルエンザ等のウイルス性疾患の先行後、激しい嘔吐、意識障害、痙攣(急性脳浮腫)と肝臓ほか諸臓器の脂肪沈着、ミトコンドリア変形、AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、CK(CPK)の急激な上昇、高アンモニア血症、低プロトロンビン血症、低血糖等の症状が短期間に発現する高死亡率の病態である。]

8. 過量投与

徴候、症状:過量投与に関する情報は少なく、典型的な臨床症状は確立していない。

処置:非ステロイド性消炎鎮痛剤による過量投与時には、通常次のような処置が行われる。

○催吐、胃内容物の吸引、胃洗浄。活性炭及び必要に応じて塩類下剤の投与。

○低血圧、腎不全、痙攣、胃腸障害、呼吸抑制等に対しては支持療法及び対症療法を行う。

蛋白結合率が高いため、強制利尿、血液透析等は、ジクロフェナクの除去にはそれほど有用ではないと考えられる。

9. 適用上の注意

- (1) 服用時: 1) 本剤はかまざに服用すること。

2) 食道に停留し崩壊すると、食道潰瘍をおこすおそれがあるので、多めの水で服用させ、特に就寝直前の服用等には注意すること。

- (2) 薬剤交付時: PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。[PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、さらには穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている。]

10. その他の注意

- (1) 外国において、肝性ポルフィリン症の患者に投与した場合、急性腹症、四肢麻痺、意識障害等の急性症状を誘発するおそれがあるとの報告がある。
- (2) 非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。


【薬物動態】

1. 生物学的同等性試験¹⁾

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1カプセル(ジクロフェナクナトリウムとして37.5mg)健康成人男子に食後単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。

	判定パラメータ		参考パラメータ		
	AUC _(0→12) (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)	MRT (hr)
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」	901.8±211.8	223.3±56.5	6.2±0.4	1.2±0.3	5.8±0.3
標準製剤 (カプセル剤、37.5mg)	937.2±188.1	240.2±81.0	6.4±0.5	1.2±0.2	5.8±0.2

(Mean±S.D., n=12)



血漿中濃度並びにAUC、Cmax等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

2. 溶出挙動²⁾

ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」は、日本薬局方外医薬品規格第3部に定められたジクロフェナクナトリウム徐放カプセルの溶出規格に適合していることが確認されている。

【葉効薬理】

1. 抗炎症作用^{3~5)}

(1) 急性炎症に対する作用

カラゲニン浮腫(ラット)及び酢酸投与による毛細血管透過性亢進(ラット、マウス)に対してインドメタシンと同等の抑制作用を示し、紫外線紅斑(モルモット)に対しては1mg/kgで強い抑制作用を示す。

(2) 亜急性炎症に対する作用

持続性後肢足蹠浮腫(ラット)に対しては0.5mg/kgで、cotton pellet法による肉芽増殖(ラット)に対しては2.5mg/kgで明らかな抑制作用を示す。また、アジュバント関節炎(ラット)に対しては1mg/kgで50倍量のイブプロフェンと同等の抑制作用を示す。

2. 鎮痛作用⁴⁾

酢酸writhing法(マウス)、Randall-Selitto法(ラット)等で、25倍量のアスピリン、20倍量のメフェナム酸と同等の鎮痛効果が認められる。


3. 作用機序⁶⁾

発痛、起炎等に関与するプロスタグランジン(PG)の生合成酵素であるシクロオキシゲナーゼを阻害し、PGの生合成を抑制する。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ジクロフェナクナトリウム(Diclofenac Sodium)(JAN)
化学名：Monosodium 2-(2, 6-dichlorophenylamino) phenylacetate
分子式：C14H10Cl2NNaO2
分子量：318.13

構造式：



性状：ジクロフェナクナトリウムは白色～微黄白色の結晶又は結晶性の粉末である。メタノール又はエタノール(95)に溶けやすく、水又は酢酸(100)にやや溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。吸湿性である。

【取扱い上の注意】

・安定性試験⁷⁾

最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度60%、3年間)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「ZE」は通常の市場流通下において3年間安定であることが確認された。

【包 装】

PTP：100カプセル、1,000カプセル

【主要文献】

- 1) 全星薬品工業(株)：生物学的同等性試験に関する資料(社内資料)
- 2) 全星薬品工業(株)：溶出試験に関する資料(社内資料)
- 3) 鶴見 介登ら：日薬理誌，69，299(1973)
- 4) 犬飼 利也ら：基礎と臨床，12，521(1978)
- 5) 鶴見 介登ら：日薬理誌，69，319(1973)
- 6) Paul, A. I. : GOODMAN and GILMAN's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed., p.669 (1990)
- 7) 全星薬品工業(株)：安定性試験に関する資料(社内資料)

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。

全星薬品工業株式会社 医薬情報部
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7
TEL 0120-189-228
FAX 06-6630-8990

発売元
全星薬品株式会社
堺市堺区向陵中町2-4-12

製造販売元
全星薬品工業株式会社
大阪市阿倍野区旭町1-2-7